




LOVAS KATALIN



▷ DR. BÁLINT GYÖRGY  
ROVATA

– Tűzbe felét!  
– Vetem.  
– Újra felét!  
– Ím.  
– Harmadikát még!  
– Lángol az is.  
– Jer, most vár az olimposzi kar!”  
(KAZINCZY FERENC: TÖVISEK ÉS VIRÁGOK)

# JÚNIUSI TENNIVALÓK A NÖVÉNYEK KÖRÜL

## LOVAS KATALIN TANÁCSAI

Az elvirágzott hagymások után most az egynyáriak és évelők igénylik a gondoskodást, és végre kiszabadíthatjuk szobafogságukból a benti növényeket.



ILLUSZTRÁCIÓ: REDDOT

### A SZOBANÖVÉNY ZUHANYRA ÉS LEVEGŐRE VÁGYIK

Ha egész nyáron kint akarjuk hagyni a naptűrő szobanövényt, előbb tegyük néhány hétre laza lombú fa árnyékába, és csak azután kerüljön napos helyre. Ha szükséges, ültessük át friss földbe. A nehezen átültethető növény földjét úgy frissíthetjük, hogy a felső néhány centiméteres réteget eltávolítjuk, és tápdús földdel helyettesítjük.

A hónap elején metsszük meg a szobai hibiszkuszt! Így dúsabbá válik, és több virág lesz rajta. Minden hajtást vágjunk vissza harmadára. A cikláment ültessük át szaruforgácsot is tartalmazó homokos földbe, és a fejlődő virágbimbókat csípjük le. Ezzel a téli virágzást segítjük elő. A cserepet tegyük hűvös, párás helyre.

### A SÖVÉNYEKET MOST KELL METSZENI

A sövényt nemcsak esztétikai szempontok miatt kell formára metszeni, hanem mert ezzel a bokrok alsó részeinek hajtásait is növekedésre serkentjük, és megakadályozzuk azok felkopaszodását.

A cserjékről vágjunk arasznyi méretű, félérett, úgynevezett zöldhajtásdugványokat, és ezeket tűzdeljük szemcsés homokkal kevert tőzegbe. Tegyük a szaporítóládát árnyékos helyre, és fedjük le üveglappal vagy átlátszó fóliával. Amint új levelek jelennek meg, távolítsuk el a borítást, és ügyeljünk arra, hogy a föld mindig nyirkos legyen. Az így szaporított cserjék ősszel beültethetők végleges helyükre. Zölddugvánnyal szaporítható a hortenzia, a rózsalonc, a nyári orgona, a fagyal. Évelők (pl. cickafark, szarkaláb) szaporításához olyan hajtásokat vágunk, amelyek nem hordoznak bimbót. A gyökereztetés körülményei azonosak a cserjék szaporításával, ám az évelők már 2-3 hét alatt begyökeresednek, és újabb két hét után kiültethetők az ágyásba, hogy már idén virágozhassanak.

## Kedves Húgom!

Emlékezetes élményben volt részem legutóbbi levelem megírása óta: a Gerecse-hegység bükkerdeiben járva, először láttam életben a medvehagyma virágzását. Sok szép tájat, természeti jelenséget és kertet volt már alkalmam láthatni, de ehhez a látványhoz legfeljebb csak a tiszavirágzás mérhető!

A medvehagyma (*Allium ursinum*) a bükk és gertyános-tölgyes erdők talaján tenyészik, sűrű, összefüggő állományban. A levelei korán tavasszal bújnak elő a földből, majd a levélpár közül emelkedik 30-40 cm magasba a hófehér hagymavirágzat. A növény minden részének a fokhagymára emlékeztető, de lágyabb, kellemes illata van. Ott jártamkor éppen fakadt a bükkfák lombja, és a friss leveleken átsütött a Nap, élénken megvilágítva a talajt, amely olyan volt, mintha friss, vastag, puha hólepel fedte volna. Sokáig álltam és nem tudtam szőhoz jutni a látványtól!

Hazaérkezve utánanézttem a medvehagymának, és megtudtam, hogy szórványos állományai többfelé is vannak, de a legnagyobb tömegben a Mecsekben és a Gerecse-hegységben található. Rövid tenyészidejű

### A FŰKASZÁLÉK NEDVESEN TARTJA A TALAJT

▷ A gyept nyírjuk gyakran, így a fűkaszálékot nem kell összegereblyézni, sőt még hasznos is hajt: nedvesen tartja a talajt. Ha hagymás virágokat is ültettünk a pázsit közé, várjuk meg, amíg ezek levelei elszáradnak, és csak ezután menjünk rá fűnyíróval.

▷ Tartós szárazságban nyírás előtt állítsuk magasabbra a fűnyíró pengéit, így árnyékban marad a fű töve.

▷ A rózsá virágait úgy szedjük, hogy ez egyúttal metszés is legyen. Kifejlett tövön négy-öt szemig, fiatalabb bokron egy-két szemig vágjuk le a virágszárakat. Az orgonáról, az azáleáról és a gyöngyvirág-cserjéről vágjuk le az elvirágzott hajtásokat!



növény: korán kezdenek kinőni a levelei, elvirágzik, magot érlel, és olyan gyorsan visszahúzódik, hogy június elejére már csak az elszáradt levelei gazdagítják az avarréteget. A régi néphit szerint a téli álmukból felébredő barnamedvek a medvehagymák levelét rágsálva tisztították a gyomrukat.

Most van az ideje a gyümölcsritkítésnek, a levélem mottójában közölt epigramma is – némi áthallással – erre utal. A gyümölcsfákon ugyanis (kedvező időjárás esetén) jóval több virág termékenyül meg, mint amennyi gyümölcsöt a fa képes beérlelni. A gyümölcskezdemények jó része (sokszor a fele-harmada) a természetes ritkulás következtében lehull, de ahhoz, hogy a gyümölcsök nagyok és zamatosan jóízűek legyenek, annyira meg kell ritkítani őket, hogy minden két, szomszédos gyümölcs között egy kifejlett gyümölcs elférjen. Ez különösen az alma-, a körte-, a kajsi- és az őszibarackfáknál fontos és eredményes.

Sokan úgy vélik, hogy a ritkítás következtében csökken a szüretelhető termés mennyisége. Ez azonban tévedés! A megmaradó gyümölcsök jobban kifejlődnek, a betegségeknek és a kártevőknek jobban ellenállnak, szebb a színük és sokkal jobb az ízük. Nagy előnye a gyümölcsritkítésnek, hogy megakadályozza a fa túlterhelését és az ennek következtében fellépő szakaszos termést, hiszen a fa nem merül ki a túlzottan sok gyümölcs kinevelése miatt, ezért a következő évben is kielégítően terem. A gyümölcsritkítást az alma- és körtefákon úgy hajtjuk végre, hogy a csomóban levő gyümölcsök közül egyet-kettőt hagyunk meg, a többi levágjuk. A kajsi- és őszibarackfák feles-

leges gyümölcskezdeményeit egyszerűen lecsavarjuk. Ezt a munkát részletekben is el lehet végezni, egészen addig, amíg a magok fejlődni kezdenek.

Ilyenkor minden növénynek sok nitrogén-tápanyagra van szüksége, ezért a kertben főként nitrogént tartalmazó műtrágyákat (pétisó, Wuxal, Volldünger stb.) szórjunk ki és munkáljunk be a talajba. A nitrogén-műtrágyák gyorsan oldódnak, és a növények rövid idő múlva hasznosítják is azokat. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a talaj felszínén maradt műtrágya a napsütés hatására gyorsan elveszti a hatását!

Befejezésül rövid választ adnék két levélre:

*Egri Ádám* olvasónk azt kérdezi, jogos-e az a vélekedés, miszerint napsütésben nem ajánlatos öntözni. Ez a vélemény teljesen megalapozott, mert napsütéses időben a kiöntözött víz jelentős része elpárolog, a növények nem tudják hasznosítani. Az érzékeny növények levelein a vízcseppek apró lencse módjára összegyűjtik a fényt és alattuk perzselési foltok keletkeznek.

*Mikola Nóra* olvasónknak válaszolom, hogy a rebarbara virágszárát tőből ki kell vágni, mert a magképződés igen sok tápanyagot használ el. A növény nem mérgező, de nyáron a levelek már nem alkalmasak főzelék készítésére.

Hát, ennyi fért a mai levelembe, kedves Húgom! A kerti munkához erőt, egészséget és türelmet kívánok.

*Kelt Kertvárosban,  
a 2009. esztendő májusának  
végén*

„A gyümölcs-  
fákon jóval  
több virág  
termékenyül  
meg, mint  
amennyit a fa  
képes beérlelni.”



TAMÁS KONYHÁJÁBAN  
ÍZES ÉTELEK OLCSÓN

24 | 2009. június 10.  
www.noklapja.hu

INDUL A STRANDSZEZON!

26 FÜRDŐRUHA

A DIVAT ROVATBAN

# nők lapja

ÁRA: 185 FT • 1,01 € / 30,43 SKK • 85 DIN • 3,7 LEI

Snoma Budapest

NE SPÓROLJUNK RAJTA  
VÁLSÁGBAN SEM!

EGÉSZSÉG  
TUDÁS  
KÖZÖSSÉG

PÁPAI  
ERIKA

„SORSSZERŰ TALÁLKOZÁS VOLT,  
IMMÁR TÍZ ÉVE”

H1N1

VÍRUSVADÁSZAT  
A PILISBOROSJENŐI  
OLTÓANYAGGYÁRBAN

10  
OLDAL  
SZÁMTALAN  
TIPP

ITTHON  
MAGYARORSZÁG  
LEGSZEBB HELYEI  
NYARALUNK

- Vizek mentén: Dunakanyar, Balaton, gyógyvizek
- Sportosan: kerékpárral, hátizsákkal túrázva
- Gyerekekkel: bobozunk, betyárok nyomában haladunk

9771419548001 09024

